

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

# ハリックス ホグリラ 冷感 鎮痛消炎パップ剤

# 6枚入

# 第2類医薬品

# LION

## 特長

Analgesic & Anti-inflammatory Cataplasm

- 痛みをもとから鎮める「フェルピナク」に加え、血流を促す「生薬アルニカチンキ」を配合した鎮痛消炎パップ剤です。
- 血流を促し、溜まった肩こり痛・首などの筋肉痛に深部からしっかり効きます。
- 弱酸性・高含水ジェルタイプなので、肌にやさしく、有効成分の浸透性に優れています。
- 伸縮性ニットなので、肩・首すじにもピッタリフィットし、貼りなおしもできます。
- ※ 1度貼って上手に貼れなかった場合に貼りなおしができます。
- 心地よい清涼感が持続します。
- 寝ている間もリラックスできる心地よいラベンダーの香りです。

## △ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないでください  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。  
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(4) 15才未満の小児。
  2. 次の部位には使用しないでください  
(1) 目の周囲、粘膜等。  
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。  
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
  3. 連続して2週間以上使用しないでください

### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

お問合せ先  
 お買い求めのお店又は下記にお問合せください  
 ライオン株式会社 お客様センター (電話:0120-813-752)  
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

## 成分 膏体100g(1400cm<sup>2</sup>)中

有効成分	分量	はたらき
フェルピナク	0.7g	鎮痛・消炎
アルニカチンキ	1.0mL (原生薬換算量0.2g)	血流促進

添加物として、*l*-メントール、ポリソルベート80、ポリアクリル酸部分中和物、ポリアクリル酸、CMC-Na、ベントナイト、クロタミトン、ジイソプロパノールアミン、N-メチル-2-ピロリドン、グリセリン、エデト酸Na、pH調整剤、香料、その他2成分を含有。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、チャックをしっかりと閉めて外気にふれないよう保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



0314

ライオン株式会社  
 〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7  
 詳しい製品情報は <http://halix.lion.co.jp/>

# 血流

を促し、  
深部から効く。

溜まった“肩こり痛”  
首などの筋肉痛に

ルリックス®

# ほぐりラ

HOGRELA

## 冷感


第2類医薬品 〈ラベンダーの香り〉

貼り方

- ① はじめにフィルム1をはがして患部に貼ります。



- ② 次にフィルム2をはがしながら貼ります。



### 効能

肩こりに伴う肩の痛み、  
筋肉痛、腰痛、関節痛、  
打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・  
足首の痛みとはれ)、  
肘の痛み(テニス肘など)

### 用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、  
1日2回を限度として、患部に貼って  
ください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (5) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。