

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鎮痛消炎パップ剤 **冷感タイプ**

第2類医薬品

LION

ハリックス55 IDプラス (微香性)

インドメタシン0.5%配合

腰・関節・肩・筋肉の痛み優れた効果を発揮します

- 1.有効成分「インドメタシン」を0.5%配合。
腰、関節、肩、筋肉の痛みのもとを直接的に鎮めます。
- 2.全方向伸縮自在のニット支持体を採用、身体の動きにピタリと密着します。
- 3.心地よい冷感が持続します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。[以前お薬を使用してアレルギー症状を起こしたことがある人は、再び同じお薬を使用すると更に強い症状を起こす可能性があります。]
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。[ぜんそくのある人がインドメタシン等の抗炎症剤を使用するとぜんそく発作を誘発することがあります。]
(3) 15才未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫(ねんざ)

用法・用量

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分 膏体100g(1000cm²)中

有効成分	分量	はたらき
インドメタシン	0.5g	炎症、痛みをおさえます。

添加物として、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ゼラチン、カオリン、*l*-メントール、尿素、エドト酸Na、グリセリン、CMC-Na、ポリアクリル酸部分中化物、D-ソルビトール、酸化チタン、ポリソルベート80、アジピン酸ジイソプロピル、マクロゴール、pH調整剤、その他3成分を含有。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります)。
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと二重に折りまげて外気にふれないようにしてください。
- (5) 使用期限(箱、袋に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください。

ライオン株式会社 お客様センター

電話:0120-813-752

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

0912

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931



発売元 ライオン株式会社 〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

製造販売元 帝國製薬株式会社 〒769-2695 香川県東かがわ市三本松567

〈ANALGESIC & ANTI-INFLAMMATORY CATAPLASM〉